



Συμπλήρωμα διατροφής με Σουκροσωμικό Σίδηρο (Sucrosomial® Iron) Φιάλη 30 ml + 1 φακελίσκος των 1,9 g

Το SiderAL® Drops Int. είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με Σουκροσωμικό Σίδηρο (Sucrosomial® Iron, Sideral® r.m.) το οποίο είναι χρήσιμο για την κάλυψη ελλιπούς διαιτητικής πρόσληψης ή αυξημένων αναγκών για το εν λόγω θερεπτικό συστατικό. Ο σίδηρος συνεισφέρει στη φυσιολογική γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Ο σίδηρος (Sideral® r.m.) που περιέχεται στο SiderAL® Drops Int. περνά άθικτος το γαστρεντερικό περιβάλλον και απορροφάται απευθείας από τον εντερικό βλεννογόνο απαφεύγοντας έτσι πιθανούς γαστρικούς ερεθισμούς.

Ενδείξεις: Το SiderAL® Drops Int. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης διατροφικής πρόσληψης, αυξημένης ανάγκης σε σίδηρο ή μειωμένης εντερικής απορρόφησης.

Συστατικά φακελίσκου: Sideral® r.m.- Sucrosomial® Iron (πωροφασφορικός σίδηρος, εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη, λεκιθίνη ηλίανθου αποξηραμένη διά ψεκασμού σε αλεύρι ρυζιού και φασφορικό ασβέστιο, προζελατοποιημένο άμυλο ρυζιού), μαλτοδεξτρίνες. **Χωρίς γλουτένη.**

Συστατικά φιαλίδιου: ύδωρ, σακχαρόζη, μαλτοδεξτρίνες, βελτιωτικό γεύσης, συντηρητικά: σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, πυκνωτικό μέσο: κόμμι ξανθάνης, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, γαλακτωματοποιητής: εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη. **Χωρίς γλουτένη.**

Ανασύσταση: 1) Ανοίξτε τη φιάλη. Προσοχή μην πετάξετε το καπάκι. 2) Τοποθετείστε τη σκόνη στη φιάλη. 3) Βάλτε το καπάκι στη φιάλη (μην χρησιμοποιείτε το σταγονόμετρο), κλείστε το καλά και αφήστε το για ένα λεπτό. 4) Ανακινήστε τη φιάλη δυνατά. 5) **Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση.**

Οδηγίες χρήσης μετά την ανασύσταση: Η συνιστώμενη δόση είναι 10 σταγόνες την ημέρα που ισοδυναμούν με 1 ml διαλύματος ή όπως συνιστάται από τον θεράποντα ιατρό. Χρησιμοποιείστε το σταγονόμετρο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Το προϊόν μπορεί να ληφθεί απ' ευθείας από το σόμα ή να διαλυθεί σε μισό ποτήρι νερό σε θερμοκρασία δωματίου, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Η παρουσία συσσωματωμάτων (σβόλων) αμέσως μετά την ανασύσταση οφείλεται στην παρουσία αντισυσσωματοποιητικών παραγόντων μέσα στη σκόνη. Τείνουν να εξαφανίζονται εντός 10 λεπτών μετά την ανασύσταση. Επομένως, συνιστάται η ανασύσταση του προϊόντος λίγα λεπτά πριν από τη χρήση.

Μέση περιεκτικότητα	Ανά ημερήσια δόση (1 ml)	ΔΤΑ%
Σίδηρος	7,00 mg	50%

ΔΤΑ% = Διατροφικές Τιμές Αναφοράς

Προειδοποίηση: Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (μικρότερη των 30°C), μακριά από πηγές θερμότητας, ηλιακό φως και νερό. Μετά την ανασύσταση να φυλάσσεται στους 4 - 8°C. **Χρησιμοποιείστε το μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ανασύσταση.** Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. Τα Συμπλήρωμα Διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής. Να χρησιμοποιείται μόνο μετά από ανασύσταση. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιεπανατολιστική θεραπεία. Αρ. Γνωστ. ΕΦΕ: 114649/09-11-2018. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο που βρίσκεται σε κάθε ζωντανό κύτταρο. Είναι το κύριο συστατικό της αιμοσφαίρινης των ερυθρών αιμοσφαίρινων παίζοντας ένα βασικό ρόλο ως μεταφορέας του οξυγόνου στα κύτταρα του σώματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου η δίαιτα δεν είναι ισορροπημένη και ποικιλή, ώστε να υποστηρίζει την ανάπτυξη των παιδιών, η σωστή συμπλήρωση των θερεπτικών ουσιών είναι απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένου και του σιδήρου, ενός χρήσιμου στοιχείου για την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Ο σίδηρος που περιέχεται στο SiderAL® Drops Int. μεταφέρεται μέσα σε φωσφολιπιδική, σουκροσωμική (Sucrosomial®) μεμβράνη η οποία προσφέρει υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Αυτή η νέα σουκροσωμική (Sucrosomial®) τεχνολογία συνεισφέρει στη βελτίωση της ανεκτικότητας από το γαστρεντερικό γιατί ο σίδηρος προστατεύεται μέσα στο σουκρόσωμα (Sucrosome®) και δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με το γαστρεντερικό βλεννογόνο.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΗ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Sucrosomial® Iron είναι ένα εγκεκριμένο σήμα.

Sucrosome® είναι ένα εγκεκριμένο σήμα.

Sideral® r.m. είναι ένα συστατικό με Σουκροσωμικό Σίδηρο (Sucrosomial® Iron) με διπλωματική ευρεσιτεχνίας.

GR-Rev. 4 of 04/23



Παράγεται και αμοσκευάζεται σε εργοστάσιο όπως υποδεικνύεται από το γράμμα του αριθμού παρτίδας: M: Nichelino (TO)- Via Mentana, 10 • V: Nichelino (TO)- Via Vernea, 129 για την εταιρεία Junia Pharma S.r.l. Via delle Lenze 216/B 56122 Pisa-Italy και προορίζεται για διανομή σε Ελλάδα και Κύπρο.

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα: Win Medica A.E.
Οιδιποδός 1-3 & Παραδρόμος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλανδρί - Αττική
Τηλ.: 210 7488821

